

ЭКЗОГЕННЫЕ (ВНЕШНИЕ) ФАКТОРЫ РИСКА РАКА ЛЁГКОГО

- курение
- загрязнение атмосферы канцерогенами (выхлопные газы, радон)
- профессиональные вредности (асбест), ионизирующая радиация





takzdrovo.ru

ЭНДОГЕННЫЕ (ВНУТРЕННИЕ) ФАКТОРЫ РИСКА РАКА ЛЁГКОГО

- хронические заболевания (туберкулёз и хроническая обструктивная болезнь лёгких)
- наследственная предрасположенность (случаи заболевания в семье)
- возраст старше 45 лет





РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ЛЁГКОГО У КУРЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ

- числа ежедневно потребляемых сигарет
- продолжительности акта курения
- стажа курильщика и типа сигарет

Курение сигар или трубки в два раза повышает риск развития рака лёгкого


→



Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики



takzdrovo.ru



Кумулятивный риск смерти от рака лёгкого у курящих выше, чем у некурящих

- у мужчин на 22%
- у женщин на 12%





ПРОФИЛАКТИКА РАКА ЛЁГКОГО

- отказ от курения
- лечение воспалительных заболеваний лёгких
- снижение контакта с вредными химическими веществами и тяжёлыми металлами
- соблюдение здорового образа жизни





Национальный центр
для здоровья органов дыхания
и профилактики



takzdrorovo.ru

В СЛУЧАЕ КУРЕНИЯ, РАБОТЫ НА ВРЕДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ОТЯГОЩЁННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

- ежегодно проходите профилактическое обследование, делайте рентгенографию или компьютерную томографию лёгких
- обратитесь к пульмонологу или онкологу за консультацией



Поделись информацией
с друзьями и близкими

